

Beoordelaars: expertisegroep

Eerste publicatiedatum: 2012

Doel: een richtlijn betreft een toeval (eclamptisch insult)

Opgesteld door: Helma Boonzaaijer, Wendelien Roepke en Marit Hitzert

Bestemd voor: kraamverzorgenden

Bevoegd om handelingen uit te voeren: n.v.t.

Inhoud:

Werkwijze – voorbereiding: n.v.t.

Werkwijze – uitvoering:

- Laat de cliënt niet alleen.
- Probeer te voorkomen dat de cliënt valt.
- Schakel zo snel mogelijk hulp in van collega kraamverzorgenden, verloskundige en gynaecoloog op het telefoonnummer: gynaecoloog 1 [37662](#)
gynaecoloog 2 [37663](#)
- NB. De aanval stopt vanzelf. Leg cliënt op linkerzij en maak in geval van bloed en slijm mond schoon.
- Controleer ademhaling, wanneer deze afwezig is, bel dan het reanimatieteam telefoonnummer: *15

Aandachtspunten:

- Een eclamptisch epileptisch insult wordt bijna altijd, voorafgegaan door prodromale klachten als hoofdpijn, visusklachten, buikklachten en misselijkheid, of door symptomen zoals hyperreflexie, snel stijgende bloeddruk en proteïnurie. Visusklachten komen veel voor bij eclampsie en pre-eclampsie.
- Ernstige pre-eclampsie moet worden beschouwd als een klinisch syndroom, waarbij het klinische beeld voor de diagnose van belang is, maar ook bloeddrukmeting en de laboratoriumbepaling van eiwit in de urine, trombocyten, leverenzymen en nierfunctie. Ook indien de aanvullende bepalingen niet als afwijkend zijn aan te merken, kunnen klinische verschijnselen en klachten aanleiding vormen voor opname en behandeling ter voorkoming van eclampsie.
- Eclampsie, gekenmerkt door gegeneraliseerde epileptische aanvallen, gaat samen met ernstige complicaties voor de vrouw. De meeste eclampsieverschijnselen zijn reversibel.

Werkwijze – nazorg: n.v.t.

Bijlagen: n.v.t.

Bronvermelding:

van Weert JM, Hajenius PJ., Richard E, Wolf H, Bleker OP. Late eclampsie post partum. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:414-7



Mol BW, van Lingen RA, van Kaam AHLC, et al. Richtlijn hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 2011.

Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 2011.

Disclaimer: de protocollen van het Geboortecentrum Sophia zijn beperkt geldig, de protocollen kunnen namelijk worden aangepast. Controleer daarom bij gebruik van een uitgeprint protocol of u beschikt over de meest recente versie via de website of het digitale GCS handboek.

